



Conocimiento para compartir

DIALOGOS FARMACEUTICOS

¿Todavía no te inscribiste? Si te sumás, podrás ingresar al Foro y acceder a las consultas que allí dejan tus colegas, o que vos mismo podrías realizar.

De esta forma, ampliamos nuestra formación e información, aproximándonos en la construcción de criterios unificados que mejoren nuestra calidad de atención al paciente.

Compartimos en este espacio algunos de los diálogos sobre el Tema vacunación antigripal 2010:

RE:Vacunación antigripal 2010

Intervenido por Eliana el 12/04/2010

¡Hola a todos! Esta es la primera vez que me pongo en contacto ustedes, pero siempre reviso las distintas intervenciones porque suelen ser de gran utilidad y entre ellas a menudo es posible encontrar preguntas que también me surgen en el trabajo cotidiano; así que en primer lugar me gustaría hacer hincapié en lo valioso de contar con este medio y por supuesto agradecer a todos los que hacen posible obtener una respuesta confiable y avalada científicamente, casi al instante. Felicitaciones!

Hoy, mi consulta es por un paciente que desea vacunarse con la vacuna trivalente, que posee varias patologías de base: es diabético y a raíz de diagnosticarle cáncer de próstata hace 5 años, comenzó a aplicarse Luprón (acetato de leuprolida) en forma trimestral, por lo cual se aplica insulina para controlar su glucemia varias veces en el día (NPH y rápida antes de las comidas). También toma ácido tióctico y enalapril. Quisiera saber si existe alguna interacción o contraindicación para su vacunación, dado que por las patologías que refiere la indicación creo que es absolutamente correcta. Por cierto ya se vacunó en años anteriores contra la gripe y también recibió P Neumo 23.

Aguardo comentarios y saludos para todos. Hasta pronto!

RE:Vacunación antigripal 2010

Intervenido por Andrea Paura el 12/04/2010

En primer lugar tanto Daniel como yo agradecemos muchísimo tus palabras que nos impulsan a

continuar mejorando estos espacios.

Con respecto a tu consulta, es interesante la misma, ya que nos permite aclarar que este tipo de vacuna (para la gripe) es una vacuna a virus inactivados. Las vacunas inactivadas, recombinantes, subunidades, polisacaridas, conjugadas, toxoides y las inmunoglobulinas pueden ser administrados a todo paciente inmunocomprometido, si bien la respuesta a cada vacuna puede ser menor.

Los pacientes inmunocomprometidos no deben recibir vacunas a microorganismos vivos, excepto en determinadas circunstancias, que no es el caso de la vacuna antigripal como mencionamos anteriormente.

La aplicación de la vacuna antigripal en diabéticos esta indicada en las Normas Nacionales de Vacunación. El documento completo se puede descargar de la Web del Colegio, sección CIMF. Por otro lado, con los medicamentos que mencionas no encontramos interacciones con la vacuna, por lo tanto esta persona puede vacunarse sin inconvenientes.

Un saludo! Andrea.

RE:Vacunación antigripal 2010

Intervenido por Cintia el 14/04/2010

¡Hola!, ¿quería saber si existe alguna alternativa para los que son alérgicos al huevo? Sería para un nene de dos años.

Saludos.

RE:Vacunación antigripal 2010

Intervenido por Paura, Andrea el 15/04/2010

Hola Cintia: no existe en el mercado ninguna alternativa, ya que las vacunas para la influenza son producidas por propagación del virus en fluidos amnióticos de huevo de gallina, o sea que todas las vacunas contienen proteínas de huevo, y poseen un riesgo potencial para los individuos alérgicos al huevo. Pero es un punto controvertido porque la cantidad de proteínas de huevo varía de un año a otro, como así también entre los fabricantes y los lotes. Los alergistas sostienen que la alergia al huevo no debería ser una causa de retraso en la vacunación. (Manual de Alergias a Medicamentos de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica-



Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología). Si existen dudas sobre la alergia al huevo es recomendable realizar un test cutáneo (o dosaje de IgE específica) a alérgenos del huevo o testificación cutánea de la vacuna con un alergista para resolver el problema. Tené en cuenta que si el test resulta negativo pero la historia sugiere un riesgo potencial de reacción anafiláctica, es prudente aplicar la vacuna bajo control médico. Por otro lado, que el test resulte positivo no necesariamente contraindica la vacunación, se debe evaluar riesgo beneficio y actuar en consecuencia. En ambos casos se sugiere la administración con un procedimiento de desensibilización realizado por personal entrenado, en ambiente hospitalario, con los elementos necesarios para tratar una posible reacción anafiláctica. Este tema fue abordado en el BFB N°399, "Diálogos Farmacéuticos) en la sección de Atención Farmacéutica, Pág. 23. También podés descargarlo de www.colfarma.org.ar sección Programa de Atención Farmacéutica, Home. Espero haber dado respuesta a tu inquietud, saludos Andrea.

RE:Consultas Varias 3
Intervenido por Juan Augusto el 16/04/2010

¡Hola a todos! Consulta: ¿saben la marca comercial de alguna leche baja en sodio existente en el mercado? Es para un lactante de 12 meses de edad (así que ya de poco sirve la S-26). Muy interesante el foro. Primera vez que participo en el, pero siempre estoy pendiente de los temas aquí tratados. ¡Saludos!

RE:Consultas Varias 3
Intervenido por Paura, Andrea el 19/04/2010

*Juan: con respecto a tu consulta sobre una leche que contenga bajo contenido en sodio, las que se encuadrarían en esa condición son las Fórmulas lácteas de Inicio (FLI). Veamos porque: la leche humana proporciona de 5 a 10 mEq de sodio al día (7 mEq/L). La leche de vaca contiene tres veces la concentración de sodio, potasio y cloro presente en la leche humana. Si se diluye la leche con agua en proporción de 2:1 el nivel de sodio disminuye a 12 mEq/L con una cantidad total de sodio, potasio y cloro de 50 mEq/L. Este nivel se considera seguro para evitar una carga renal de solutos excesivos. Las FLI están desmineralizadas y se logran concentraciones de electrolitos entre los valores de leche materna y los límites superiores recomendados. Por lo tanto, aunque el bebé supere los 6 meses, estas leches serían las recomendadas. Más información podés consultar en el siguiente link:
<http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria/pal2/lechmat.htm>*

*En Argentina, las FLI están descriptas en el Formulario Terapéutico Nacional (2005), en el cual se encuentran los componentes, concentraciones y marcas comerciales y presentaciones. En el caso puntual de la leche S-26, debería ser la S-26 gold, pero hay otras marcas en el mercado. En el documento jpg adjunto te pasamos el listado.
Un saludo Andrea.*

Archivo Adjunto: ScannedImage-18.jpg (177.2 KB.)

Para inscribirte ingresa en www.colfarma.org.ar, dirígite a la subsección Actividades del PAF, Atención Farmacéutica abierta a la Comunidad.

Acofar Cooperativa Farmacéutica
Líder en distribución y servicios integrales para la Farmacia

Camino al cincuentenario

